

TUMBADOR®

250 SC

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Ingrediente activo: Lambdacihalotrina + Ciromazina

Concentración: 50 g / l + 200 g / l

Grupo químico: Piretroide + Triazina

CARACTERÍSTICAS	BENEFICIOS
Doble mecanismo de acción (Disruptor de la muda y Modulador del canal de Na)	<ul style="list-style-type: none"> * Controla adultos y estados inmaduros * Produce en pocos minutos la desorientación y el cese de alimentación del insecto * Es aplicado y rápidamente los insectos muestran síntomas de envenamamiento (excitación; parálisis); ofreciendo un efecto de control rápido y contundente
Efecto transovarico (Huevos ovipositados por hembras tratadas no eclosionan)	* Producto de alta eficacia para el control de minadores (dípteros)
Sistemia acropetal	* Posee una alta residualidad, asegurando esto una prolongada acción del producto, generando más tiempo de control
Las dosis subletales son repelentes	<ul style="list-style-type: none"> * Ofrece ciertas propiedades repelentes a los insectos minimizando daños al cultivo * Ocasiona un efecto en el cese de la alimentación

RECOMENDACIONES

CULTIVOS	BLANCO BIOLÓGICO	DOSIS	P.C.	P.R.
ARVEJA	Minador (<i>Liriomyza trifolii</i>)	450 cc / Ha	15 Días	12 Horas
CEBOLLA	Minador (<i>Liriomyza huidobrensis</i>)	750 cc / Ha	14 Días	
FRIJOL	Minador (<i>Liriomyza huidobrensis</i>)	450 cc / Ha	15 Días	
MELON	Minador (<i>Liriomyza trifolii</i>)	120 cc / 200 l	3 Días	
PAPA	Tostón (<i>Liriomyza quadrata</i>)	450 cc / Ha	14 Días	
POMPON	Minador (<i>Liriomyza trifolii</i>)	900 cc / Ha	N.A.	
TOMATE	Minador (<i>Liriomyza trifolii</i>)	450 cc / Ha	5 Días	

MODO DE ACCIÓN

TUMBADOR 250 SC es un insecticida sistémico que actúa por contacto e ingestión, con efecto de volteo.

MECANISMO DE ACCIÓN

TUMBADOR 250 SC actúa sobre el sistema nervioso de los insectos alterando el flujo de iones a través de la membrana nerviosa (modulares del canal Na). Produce en pocos minutos la desorientación y el cese de alimentación del insecto. Adicionalmente; interfiere los procesos de muda, la pupación normal y la posterior formación del adulto; en conjunto, interrumpe el ciclo de desarrollo de las larvas.

P.C.: Período de Carencia: Días que deben transcurrir entre la última aplicación y la cosecha.

P.R.: Período de Reingreso: Intervalo que debe transcurrir entre la aplicación y el reingreso de personas al área tratada.

N.A.: No aplica.

OBSERVACIONES

Fitotoxicidad: No presenta fitotoxicidad si es empleado en la dosis, cultivos y momento recomendados para su uso.

Compatibilidad: Se recomienda hacer una prueba de mezcla previa a la preparación comercial y pruebas de fitocompatibilidad a pequeña escala antes de la aplicación comercial bajo la responsabilidad del usuario. **TUMBADOR 250 SC** es incompatible con productos de reacción alcalina.

PRESENTACIONES 1, 4 y 20 litros, 200 y 500 cc

EMERGENCIAS TOXICOLÓGICAS 24 HORAS CISPROQUIM 01 8000 916 012 FUERA DE BOGOTÁ. EN BOGOTÁ COMUNICARSE CON EL TELÉFONO 2886012.



CATEGORÍA TOXICOLÓGICA II - MODERADAMENTE PELIGROSO



Registro Nacional ICA No. 969

DISTRIBUIDO POR AGROACTIVO
www.agroactivocol.com