

# FOSTER® 250 EC

PROTECCIÓN DE CULTIVOS

FUNGICIDA

## 1. Composición:

Propiconazol ..... 250 g/L  
(+)-1-[2-(2,4-dichlorophenyl)-4-propyl-1,3-dioxolan-2-ylmethyl]-1H-1,2,4-triazole, de formulación a 20°C

## 2. Características del producto:

Familia química: Triazoles

Clasificación toxicológica (OMS): II Moderadamente peligroso

Usos: Fungicida

Código FRAC: G1

## 3. Modo y mecanismo de acción:

FOSTER® 250 EC es un fungicida sistémico, la sustancia activa es absorbida rápidamente por las partes de la planta que intervienen en el proceso de asimilación y es transportado en forma acropétala (ascendente). Inhibe la C-14 demetilasa en la síntesis del ergosterol.

## 4. Equipo de aplicación:

Utilice equipos convencionales de aspersion.

## 5. Recomendaciones de uso:

Cultivos autorizados para Colombia:

Cultivo	Enfermedad	Dosis
Plátano y banano	Sigatoka Negra ( <i>Mycosphaerella fijiensis</i> var. <i>difformis</i> )	0.4 L/ha
Arroz	Manchado del grano ( <i>Helminthosporium oryzae</i> , <i>Rhynchosprium oryzae</i> , <i>Curvularia lunata</i> )	0.5 L/ha

## 6. Intervalo de aplicación:

En Arroz: Aplicar cuando el cultivo tenga 5% de espigamiento.  
Plátano y banano: Para épocas lluviosas, se recomienda un programa de 6-8 ciclos de aplicación de FOSTER® 250 EC ya sea aplicado en un solo bloque o en dos de tres a cuatro aplicaciones, interrumpidos o seguidos por algunos ciclos de otros productos con diferente modo de acción.

### 7. Intervalo entre la última aplicación y la cosecha:

Banano y plátano: 1 día.  
Arroz: 30 días.

### 8. Intervalo de reingreso al área tratada:

4 horas.

### 9. Fitotoxicidad:

A las dosis recomendadas, no se han observado síntomas de fitotoxicidad en ninguno de los cultivos indicados en la etiqueta.

### 10. Compatibilidad:

Es indispensable realizar previamente un ensayo de compatibilidad antes de realizar cualquier tipo de mezcla. En banano el producto es miscible en la mayoría de los aceites utilizados, así mismo en emulsiones de aceite y agua.

### 11. Registro de Venta ICA:

160

Leer las especificaciones de este producto (hojas de seguridad y demás literatura relacionada) antes de su uso. Se recomiendan pruebas previas antes de utilizarlo. El formulador garantiza que el contenido de este producto está acorde a lo indicado. No es posible controlar el manejo y almacenamiento después de adquirido por lo que no se ofrece garantía por el uso incorrecto que realice el comprador o consumidor; quien deberá aceptar el riesgo bajo estas condiciones.  
Versión 03.